

# CENTRE DENTAIRE

DRE CAROLINE BLAIS

## Instruction postopératoire

Suivez la posologie des médicaments prescrits.

Les analgésiques doivent être pris tel que prescrit pour prévenir l'apparition de douleur.

Si vous avez des antibiotiques à prendre, vous devez faire une prise complète.

Les mesures d'hygiène, brossage et rinçage sont les seuls moyens de prévenir une infection postopératoire.

Pour contrôler le saignement, si une compresse est appliquée dans votre bouche, vous devez la conserver en place une heure avec une pression. Vous ne fumerez pas, vous n'utiliserez pas une paille pour boire ni cracher les 2 premiers jours suivant votre intervention.

Pour contrôler l'enflure vous appliquerez des compresse froide (glaçons dans un sac et serviette humide autour) au visage, à la région traitée pour 20 minutes. Après une pose de 10 minutes, vous recommencez l'application de froid. L'application de froid est utile les 4 premiers jours. Ne pas utiliser de chaleur.

La diète sera molle et facile à manger pour les 3 premiers mois. Les micromouvements engendrés par le bolus alimentaire ou par des parafunctions (serrage des dents) sur la tête de l'implant sont défavorables à l'ostéointégration. Si je vous ai remis une plaque de protection occlusale, il est de votre devoir de la porter.

Les points de sutures seront retirés lors d'une visite de contrôle. Ne pas tirer sur les fils.

Occasionnellement, les vis de couverture ou tout autre restauration temporaire visées, peuvent se dévissées. Simplement me contacter.

Dans les cas de greffes osseuse et chez les patients prenant des médicaments pour éclaircir le sang, il n'est pas rare de constater un bleu (ecchymose). Cette situation prend habituellement 14 jours à disparaître.

Bonne guérison !